

ФЛОРИСТИКА

УДК 581.9 (470.44)

О НОВОМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ДУРНИШНИКА КАЛИФОРНИЙСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М. А. Березуцкий, А. С. Кашин

*Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
e-mail: berezutsky61@mail.ru*

Сообщается о новой находке дурнишника калифорнийского на территории Саратовской области.

Ключевые слова: флора, Саратовская область, дурнишник калифорнийский.

ABOUT A NEW LOCATION OF CALIFORNIAN COCKLEBUR ON THE TERRITORY OF SARATOV REGION

M. A. Berezutsky, A. S. Kashin

It is reported about a new find of Californian cocklebur on the territory of Saratov Region.

Key words: flora, Saratov Region, Californian cocklebur.

Дурнишник калифорнийский (*Xanthium californicum* Greene, Asteraceae, Magnoliophyta) – адвентивное североамериканское растение, которое на территории европейской части России встречается в Волго-Донском и Нижне-Донском регионах (Протопопова, 1994). Уже

в 70-х гг. прошлого века д. калифорнийский был найден в южной части саратовского Заволжья (Янчуркина, 1976), которое непосредственно граничит с Саратовской областью.

На территории Саратовской области данный вид впервые был обнаружен В. В. Маевским с соавторами (2003) в Новоузенском и Александрово-Гайском районах. Авторы особо подчеркивали, что правильность определения вида была подтверждена В. Н. Тихомировым.

А. Г. Еленевский, Ю. И. Буланый и В. И. Радыгина, работая над новым «Конспектом флоры Саратовской области» (2008), не только сами не смогли найти этот вид на территории региона, но также сочли указания В. В. Маевского с соавторами ошибочными и основанными на неправильном определении.

В 2011 г. дурнишник калифорнийский был обнаружен нами на территории Краснокутского района области (окр. с. Лебедевка; выгон, массово. 26.10.2011. М. Березуцкий, А. Кашин). Обертки пестичных корзинок на стадии плодоношения у собранных экземпляров имеют характерные для д. калифорнийского крючковидно загнутые клювики (рисунок).

Выявленное нами местонахождение расположено недалеко от тех районов, для которых данный вид приводился В. В. Маевским с соавторами (2003). Таким образом, В. В. Маевский и его коллеги абсолютно верно указали д. калифорнийский для территории саратовского Заволжья и внесли реальный вклад в выявление видового состава сосудистых растений региона. Можно предположить, что этот вид будет найден и в других районах области.

Считаем также, что огульное отрицание данных В. В. Маевского и его соавторов является разрушительным для процесса изучения флоры Саратовской области.

Сборы д. калифорнийского из Краснокутского р-на Саратовской области хранятся в отделе биологии и экологии растений УНЦ «Ботанический сад» Саратовского государственного университета.



Обертки корзинок на стадии плодоношения у дурнишника калифорнийского из окр. с. Лебедевка Краснокутского р-на Саратовской области

Список литературы

Еленевский А. Г., Буланый Ю. И., Радыгина В. И. Конспект флоры Саратовской области. Саратов : Наука, 2008. 232 с.

Маевский В. В., Бояков М. Х., Трунова В. М. и др. Заносные виды в агрофитоценозах Саратовской области // Бюл. Бот. сада СГУ. Вып. 2. Саратов : Науч. книга, 2003. С.9–10.

Протопопова В. В. Триба Heliantheae Cass. // Флора европейской части СССР. Т. 7. Л. : Наука, 1994. С. 25–52.

Янчуркина А. А. Флористический состав и распространение сорных растений Куйбышевской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук. Л. ; Пушкин, 1976. 24 с.

УДК 581.9 (470.44)

К ВОПРОСУ О ПРОИЗРАСТАНИИ ЯТРЫШНИКА ОБОЖЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М. А. Березуцкий, Л. А. Серова, А. С. Кашин

*Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
e-mail: kashinas@sgu.ru*

Сообщается о находке ятрышника обожженного на территории национального парка «Хвалынский».

Ключевые слова: флора, Саратовская область, ятрышник обожженный.

ABOUT DERMINATION OF DARK-WINGED ORCHIS ON THE TERRITORY OF SARATOV REGION

M. A. Berezutsky, L. A. Serova, A. S. Kashin

It is reported about a new find of dark-winged orchic on the territory of National Park «Hvalynsky».

Key words: flora, Saratov Region, dark-winged orchic.

Ятрышник обожженный (*Orchis ustulata* L., Orchidaceae, Magnoliophyta) – многолетнее травянистое растение, распространенное в Европе, Средиземноморье, на Кавказе и в Малой Азии (Смольянинова, 1976). Вид занесен в «Красную книгу Российской Федерации» (2008); указывается для областей средней полосы европейской части России как очень редкое растение (Аверьянов, 2006).