

Флора европейской части СССР /Ред. И.Н.Цвелеев. - Л.: Наука, 1981 . Т. 5.- 380 с..

Худякова Л.П., Панин А.В., Шилова И.В. Некоторые материалы к флоре Саратовской области // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: Сб. научн. ст. - Изд-во Сарат. пед. ин-та, 2000.- Вып. 3.- С.40-41.

Янишевский Д.Е. К флоре Саратовского уезда // Сельскохозяйственный вестник Юго – Востока, 1919.- № 3 – 5. - С. 30 – 33.

УДК 581.9 (470. 44)

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ БАЛТАЙСКОГО И БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Шилова, А.В. Панин

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

В настоящей статье мы продолжаем публикацию материалов, собранных во время работы экспедиции флористического отряда Ботанического сада Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах Саратовской области. Здесь мы приводим ряд видов растений, ранее не отмеченных для этой территории во флористических сводках (Конспект ..., 1977-1983; Еленевский и др., 2000) или являющихся очень редкими на данной территории, представленных единичными находками.

Гербарный материал хранится в Гербарии Ботанического сада Саратовского госуниверситета.

*Asarum europaeum* L. Базарно-Карабулакский район, окр. с. Алексеевка, по лесистому берегу ручья Серебряный. 6.06.2001 г. И.В. Шилова.

*Cardamine impatiens* L. Балтайский район, 2-3 км к юго-западу от с. Столыпино, по берегу лесного ручья. 27.06. 2001 г. И.В. Шилова, А.В. Панин. Новость для флоры района.

*Cephalaria uralensis* (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. Базарно-Карабулакский район, окр. с. Сухой Карабулак, на склоне с кальцефильной растительностью. 27.08.2000 г. И.В. Шилова, А.В. Панин. На этом же склоне встречена небольшая популяция другого кальцефильного вида – *Scabiosa isetensis* L.

*Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton Балтайский район, окр. с. Столыпино, к западу от села, бор на плакоре. 27.06.2001 г. А.С. Кашин, И.В. Шилова. Редкое в Саратовской области растение, ранее известное всего из двух местонахождений. Занесено в Красную книгу области (1996).

*Gentiana cruciata* L. Этот вид мы обнаружили в двух точках Балтайского района: на поляне в дубраве в 2-3 км к западу от села Калинино (ныне Столыпино). 19.05.1982 г. И.В. Шилова. и на опушке березняка в 3 км к западу от с. Пилюги. 25.07. 1983 г. И.В. Шилова.

*Gymnadenia conopsea* (L.) Br. Базарно-Карабулакский район, влажный луг в березняке в 2 км к западу от пос. Базарный Карабулак. 26.06.1987 г. Из этого

местообитания собиралась И.В. Шиловой совместно с Е.А. Киреевым, в работе которого (Киреев, 1993) сообщались данные об этой находке, но без цитаты гербарной этикетки. В недавно вышедшей монографии А.Г. Еленевского с сотр. (2000) указывается только для с. Белогорного Вольского района.

*Linum perenne* L. Базарно-Карабулакский район: 1) окр. с. Алексеевка, степные участки, на мергеле 8.06.1984 г. И.В. Шилова 2) окр. с. Сухой Карабулак, склон юго-западной экспозиции, на карбонатном субстрате. 27.08.2000 г. И.В. Шилова, А.В. Панин

*Ortantella lutea* (L.) Rauschert Базарно-Карабулакский район, окр. с. Сухой Карабулак, вдоль посадок над оврагом «Кладбищенский», а также на сухих лесных полянах в верховьях этого оврага, в лесу «Брусличный суходол». 7.09.2000 г. И.В. Шилова, А.В. Панин.

*Serratula coronata* L. Заливной луг в березняке в 2 км к западу от пос. Базарный Карабулак. 26.06.1987 г. И.В. Шилова.

*Silene sibirica* (L.) Pers. Весьма обычная смоловка саратовской флоры. На исследованной территории, кроме растений типового подвида, встречены экземпляры, принадлежащие к особому подвиду *Silene sibirica* subsp. *kleoporii* Tzvel. Отнесение наших экземпляров к этому таксону подтверждено Н.Н. Цвелевым (LE).

*Veronica officinalis* L. Еще одно местонахождение этого редкого, занесенного в Красную книгу Саратовской области (1996) вида, было обнаружено в Базарно-Карабулакском районе между с. Алексеевка и пос. Базарный Карабулак, на обочине лесной дороги (на вторичном местообитании!) в дубраве. 26.06.2001 г. И.В. Шилова, А.В. Панин.

*Viola montana* L. (= *V. elatior*) Базарно-Карабулакский район: 1) Разреженный дубовый лес на южном склоне в 1 км к западу от с. Алексеевка 17.07.1984 г. И.В. Шилова; 2) Дубрава на опоке к северо-западу от с. Б.Гусиха. 16.05.1985 г. И.В. Шилова. В Конспекте флоры Саратовской области (1979) приводится сразу под двумя названиями, что осложняет понимание распространения данного таксона на исследуемой территории.

#### ЛИТЕРАТУРА

Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Растения Саратовского Правобережья (конспект флоры). – Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 2000. - 102 с.

Киреев Е.А. Материалы к флоре Саратовской области // Вопросы ботаники Нижнего Поволжья. Межвуз. сб. научн. тр.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1993.- Вып. 7.- С. 66-71.

Конспект флоры Саратовской области. - Саратов. Изд-во Сарат. ун-та., 1977. -Ч. 1. - 80 с. ; 1979. - Ч. 2. - 88 с.; 1983. - Ч.3. - 108с.; 1983. - Ч.4. - 64с.

Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов: Детская книга, 1996. - 264 с.